



FASE FENOLOGICA

FINE FIORITURA

PAROLE CHIAVE:

BORO POST-FIORITURA

BOLLETTINO

OLIVO

07.06.2024

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

Le settimane sono state caratterizzate da instabilità con temporali anche forti e forte escursione termica. Si segnala il rilevamento sporadico dei primi adulti di **Cimice asiatica** (*Halyomorpha Halys*) ai bordi dei campi, attualmente cimice asiatica non crea problematiche. Per i fitofagi secondari **non si registrano rosure di Margaronia** (*Palpita unionalis*) continua ad esserci la sporadica presenza di **Cocciniglia mezzo grano di pepe** (*Saissetia oleae*) e **Cotonello dell'olivo** (*Euphyllura olivina*) entrambi **non destano preoccupazione e non richiedono interventi**.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Negli **oliveti dove la fioritura si è conclusa** è possibile **eseguire una concimazione fogliare con il BORO in post fioritura** ma solamente in quegli oliveti dove cronicamente è presente questo problema. **Sempre negli oliveti in cui la fioritura è conclusa** si può intervenire con un trattamento fogliare **con UREA alla concentrazione tra l'1 % e il 1,5% in volume**, questo è utile soprattutto per coloro che non hanno eseguito una concimazione azotata al terreno.

CONSIGLI AGRONOMICI

Dove la fioritura si è conclusa nel caso ci fosse bisogno, si possono riprendere i trattamenti con **ossicloruro di rame**, per proteggere la nuova vegetazione da infezioni di occhio di pavone (sia in biologico che in convenzionale).

Si ricorda inoltre che possono essere utilizzati prodotti a base di *Bacillus subtilis* sia nel biologico che in convenzionale.

Si ricorda che non possono essere svolti trattamenti con prodotti fitosanitari durante la fioritura / solo se vietato in etichetta

CONSIGLI D'INTERVENTO



Adulto di **Cimice asiatica**-
Areale Valtenesi

Si rinnova l'invito a segnalare la presenza di **Oxythyrea funesta** (foto) un coleottero polifago che da adulto si nutre di fiori (antofago). Si ricorda che gli antofagi nella maggior parte dei casi su olivo non causano danni economicamente rilevanti. Questo in virtù del fatto che olivo produce un'elevata quantità di fiori, soprattutto nelle annate di carica come quella di quest'anno.

Comunque, per monitorare meglio la situazione e capire la diffusione di quest'insetto, si invitano gli olivicoltori a riportare i casi di avvistamento su olivo di questo coleottero, sia tramite mail, sia tramite numero cellulare o messaggio WhatsApp.

SEGNALAZIONI



Adulto di Oxythyrea funesta su fiori d'olivo



Fase fenologica attuale-Areale Garda



Fase fenologica attuale- areale Garda



Sintomi di boro-carenza

AREALE SEBINO

La fase fenologica riscontrata in campo è **fine fioritura**

I rovesci temporaleschi degli ultimi giorni potrebbero ancora favorire le **infezioni primarie di occhio di pavone** soprattutto negli areali con scarsa ventilazione. Si continua a segnalare la presenza di cimice asiatica in oliveti ben esposti.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

È possibile eseguire un'integrazione del **BORO** tramite una **concimazione fogliare solo per quegli oliveti dove la fioritura si sia conclusa e dove la carenza di questo elemento sia cronica**, il Boro è un microelemento molto importante che è coinvolto nella fertilità dei fiori, il trattamento in post fioritura serve a garantirne un'integrazione alla pianta di questo elemento.

CONSIGLI AGRONOMICI

Nel caso ci fosse bisogno d'intervenire contro occhio di pavone è possibile effettuare un intervento con prodotti a base di **Bacillus subtilis** o con **ossicloruro di rame ma solo** in quegli oliveti **più precoci dove la fioritura si sia già conclusa**.

CONSIGLI D'INTERVENTO



*Fase fenologica rilevata -
areale sebino*



*Sintomi di Boro carenza -
areale sebino*

AREALE LARIO

Gli olivi sono nella fase fenologica **fioritura**.

Fiori aperti o prossimi all'apertura. **Fioriture copiose nella maggior parte degli oliveti**, in molti casi associati a consistente ricambio di foglie a seguito di infezioni fungine primaverili.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Non risultano necessari interventi agronomici in questa fase.

CONSIGLI AGRONOMICI

In questa fase **sospendere i trattamenti**, per evitare interferenze con la fioritura.

CONSIGLI D'INTERVENTO

NOTIZIE UTILI E COMUNICAZIONI

Si comunica che **la CCAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2402)**, le domande possono essere **presentate dall'8 Aprile 2024 fino al 31 Ottobre 2024**. Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/imprese-olivicole>

BANDI